

ESCROTO AGUDO

Orquialgia

- **Escroto agudo**
 - Torção testicular
 - Orquiepididimite



- Varicocele




Figura 1. Varicocele grau 3 (saco de vermes)

- Tumor testicular

TORÇÃO TESTICULAR

X

ORQUIEPIDIMITE

IDADE

INÍCIO

DOR

NÁUSEA

FEBRE

EXAME FÍSICO

HEMOGRAMA

SUMÁRIO

ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER

ORQUIEPIDIDIMITE - Tratamento

- Analgésico
- Anti-inflamatório
- Antibiótico
- Bolsa de gelo
- Suspensório escrotal
- Repouso

TORÇÃO TESTICULAR - **Tratamento**


- Até 6 horas – Distorcer e orquidopexia bilateral
- Após 6 horas – Provável orquiectomia e orquidopexia contralateral
- **Em caso de dúvida operar**

Torção Testicular



ORQUIDOPEXIA BILATERAL

Torção Testicular



ORQUIECTOMIA + ORQUIDOPEXIA CONTRA-LATERAL

PROTOCOLO

- ORQUIEPIDIDIMITE – Suspensório escrotal, repouso, anti-inflamatório, antibiótico quando tiver fator infeccioso associado.
- **TORÇÃO TESTICULAR AGUDA** – **Contactar urologista de sobre-aviso** para cirurgia de urgência. Será realizado avaliado viabilidade testicular com orquiopexia bilateral.
- OBS. **Torção tardia há mais de 24H** – encaminhar ambulatório do urologista para tratamento cirúrgico eletivo.