


Medicamentos Antiparasitários

Prof. Dr. Fernando Pedrosa

Pilar/AL 26/02/2026

Praziquantel



- Atua provocando uma alteração no fluxo de ions de cálcio nas células do parasito gerando uma contração muscular espástica.
- Apresentação
Comp 150mg, 500 mg e 600 mg.
- Preço
150 mg caixa c/12 comp. R\$ 150,00

Albendazol



- Atua bloqueando a absorção de glicose

- Apresentação

Comp. 200 e 400 mg


Susp. 40 mg/ml em 10 ml

- Preço

Comp. 400mg R\$ 10,00


Susp 40mg/10ml R\$ 12,82

Ivermectina




- Lactona macrolítica semisintética,
- Inibe a atividade do ácido gamaminobutirico (gaba) imobilizando os helmintos.
- EctoParasitas: Sarcoptes scabiei, pediculose
- Apresentação
2 comp. de 6 mg
- Preço caixa c/02 comprimidos:
R\$ 15,00

Nitazoxanida




- É um anti parasitário polivalente ativo contra helmintos e protozoários intestinais.
- Nos helmintos atua por inibição da polimerização da tubulina, nos protozoários o mecanismo é desconhecido, acredita-se que atue interferindo na enzima piruvato-ferridoxina-oxidoreductase, bloqueando a transferência de elétrons;
- Absorvido pelo trato intestinal, hidrolizada em tizoxanida
- Excretado por via renal, biliar e fezes;
- Não deve ser administrado em pacientes com doença renal ou hepática;
- Posologia: para crianças maior que 1 ano: 7,5mg/kg a cada 12h durante 3 dias, para adultos: 500mg a cada 12h durante 3 dias com alimentos;
- Apresentação: Comp. 500mg caixa com 6 comp., pó suspensão de 45 e 100ml com 20mg/ml.
- Preço: Frasco de 45ml por R\$ 16,99 a 32,43, de 100ml por R\$ 24,00 a 65,00 e caixa com 6 comp. por R\$ 18,00 a 27,69.

Nitazoxanida



- Já foi aprovado o uso da nitazoxanida para reduzir o impacto do rotavirus.
- Está sendo investigada como possível auxiliar ao tratamento da hepatite C.

Esquistosomose



Praziquantel


50 a 60 mg/kg dose única

Taeníase



- Praziquantel
10 mg/kg, dose única.
- Albendazol
400 mg/dia, durante 3 dias ou 10mg/kg.

Cisticercose



- Praziquantel
50 mg/kg/dia, em 2 a 3 tomadas, por 21 dias.
- Albendazol
15 a 25 mg/kg/dia, durante 8 a 30 dias.
- Associar corticosteroides.

Hymenolepdíase

- Praziquantel
20 a 30 mg/kg/dia, dose única



Ascaridíase

Albendazol

adultos: 400 mg, dose única

crianças. 10 mg/kg/dia, dose única.



Trichuriase

Albendazol




Enterobíase

- Albendazol
- Obs.: repetir o tratamento com 3 semanas



Ancylostomose

- Albendazol
- Obs.: suplementar com sulfato ferroso e caso de anemia.



Larva migrans cutânea

- Tiabendazol
50 mg/kg dose única
Uso tópico
- Albendazol
400 mg/dia, durante 5 dias
- Ivermectina



Estrongiliodíase

- Albendazol
400 mg/dia, durante 3 dias
- Ivermectina
- Obs.: uso de laxativos, repetir o tratamento



ferpedrosa@hotmail.com

Fone: (82) 99331-1692