


Sífilis Congênita Seguimento



Edilma de Albuquerque Lins Barbosa
Conselheira



Historia :

- ➡ Alexander Fleming (1928)
 - ➡ Howard Florey e Boris Chain (1941)
 - ➡ Em 2017 ????
- 



Definição:

- Sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum*, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para seu conceito, por via transplacentária. ocorrendo assim transmissão vertical.
- Importância do pré-natal.
- Testes para detectar a sífilis.




Taxa de infecção :

- Na infecção primária e secundária, em mulheres não tratadas, é de 70% a 100%, nas fases tardias é de 30%
- Durante o aleitamento e o canal de parto pode ocorrer transmissão se houver lesão sífilítica.
- Abortamento, natimorto ou morte perinatal é de 40%, em mulheres não tratadas.




Complicações:

- Aborto espontâneo
 - Parto prematuro
 - Malformação do feto
 - Morte ao nascer
 - Surdez
 - Cegueira
 - Deficiência mental
- 



Sífilis Congênita:

- Precoce até dois anos.
 - Tardia após os dois anos.
- 




Quadro Clínico.

- Sífilis precoce:
- Prematuridade, baixo peso, hepatomegalia, lesões cutâneas pênfigo palmo-plantar, periostite ou osteíte ou osteocondrite, icterícia, sofrimento respiratório.
- Anemias, leucocitose,paquetopenia.
- Hidropsia, edema, convulsão e meningite.




Quadro clínico.

- Sífilis tardia
 - Fronte olímpica, nariz em sela, mandíbula curta, tíbia em lâmina de Sabre, dentes de Hutchinson, molares em amora, arco palatino elevado.
 - Surdez neurológica.
 - Dificuldade no aprendizado.
- 



Diagnóstico da sífilis

- Testes Sorológicos:
 - Não treponêmica:
 - VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory)
 - RPR (Rapid Plasma Reagin)
 - Treponêmica:
 - TPHA, FTA-Abs, ELISA.
- 



Outros exames:

Estudo do Líquido cefalorraquidiano (LCR- líquido)

Estudos de imagem

Hemograma

BTF

Reticulocitos

Plaquetas

Outros.




Controle e Prevenção:

- Vigilância Epidemiológica:
- Sífilis em gestante (portaria 33, de 14 julho de 2005)
- Definição de caso sífilis em gestantes para fins de vigilância epidemiológico.
- SINAN, locais de notificação (pré-natal).
- Fluxo de informação (como definir sífilis congênita)
- Tipo: 1, 2, 3 e 4.




Controle da Sífilis Congênita

- 
- Medidas Gerais:
 - Captação precoce da gestante
 - Realização de consultas integral e qualificada
 - Exames
 - Tratamento e seguimento adequado da gestante e parceiro.
 - Resultados dos exames na carteira da gestante
 - Notificação de sífilis congênita
 - Orientações gerais, antes e durante a gestação.



Tratamento e seguimento

- Tratamento adequado na gestante
 - Tratamento Inadequado para sífilis materna.
 - Curetagem por abortamento.
- 



Manejo adequado do RN

- Realizar VDRL em todos RN cujas as mães apresentaram VDRL reagentes na gestação
- Exames (laboratoriais, imagem,LCR).
- Tratamento imediato RN e sífilis materno (incluindo a parceria sexual)
- Notificação e Investigação obrigatório de todos casos.



Tratamento e Seguimento no RN

- Na impossibilidade de realizar exames e mães reagentes na gestação (trata o caso como neurosífilis)
- Penicilina G Cristalina (50.000UI/KG/dv de 12/12horas e após 7 dias de vida de 8/8horas) 10 dias.
- Penicilina G procaína ??
- Exames normais e sem alterações clínicas (P. G benzatina e acompanhamento obrigatório.
- VDRL do RN reagente maior do que da mãe:???(exames normais)



Seguimento da Criança:

- Consultas ambulatoriais mensais
- Realizar exames com 1 mês, 3, 6 e 18 meses de idade.
- Caso dois VDRL negativos seguimento interrompido.
- LCR alterado realizar avaliação com 6 meses.
- Realizar exames teponêmicos (FTA-Abs e ELISA).
- Sinais clínicos compatíveis com ITC, repetir exames.
- Como 18 meses título sorológico não negatificação ou elevação reinvestigar e tratamento.




RN Exposto

Exames


- Oftalmológico
- Neurológico
- Audiológico



Notificação compulsória

- 
- Sífilis em gestante: O-98.1
 - Sífilis congênita: A-50.9
 - Fontes: MS. Sociedade de Pediatria. CDC (Centro de controle e prevenção de doenças. Doenças sexualmente transmissíveis).

Natimorto



Sífilis precoce



Sífilis precoce



Lesões tardias



Cabe tudo num abraço!



o a.